

	Post operatorio ISTRUZIONI PER PAZIENTI OPERATI DI CHIRURGIA DACRIOCISTORINOSTOMIA	Mod. 0129	Pag. 1 di 1
		Parola chiave:	istruzioni ORL
		Rev. 00	del 21/01/2026

UNITA' OPERATIVA OTORINOLARINGOIATRIA

DOPO L'INTERVENTO CHIRURGICO

Nelle prime fasi post-operatorie è possibile che si presentino sensazioni di abbagliamento, fastidio, lieve dolore nell'occhio interessato dall'intervento. Ciò non deve preoccupare ma è importante comunicarlo al medico che le prenderà in considerazione.

Nei primi giorni l'occhio appare più o meno rosso, generalmente non dolente; inoltre si potrà avere lacrimazione, fotofobia (fastidio alla luce), edemi (gonfiore) ed ecchimosi (lividi). Queste manifestazioni si risolvono spontaneamente entro un periodo variabile da alcuni giorni a qualche settimana.

L'intervento min question è effettuato su strutture esterne all'occhio, per cui la visione (visus) rimane inalterata; tuttavia a causa dell'utilizzo di pomate o gocce oftalmiche si potrà avere la sensazione di vedere un po' annebbiato.

FIN DAI PRIMI GIORNI DOPO L'INTERVENTO, COSA NON SI PUO' FARE:

- Sforzi fisici intensi o attività sportive per le 2 settimane successive all'intervento;
- Dormire a pancia in giù con la faccia rivolta verso il cuscino (per almeno due settimane);
- Strofinare l'occhio operato (per almeno un mese).

È SCONSIGLIATO

- L'uso di lenti a contatto nei primi giorni e se possibile fino alla rimozione dell'impianto in silicone;
- In caso di forte dolore meglio non assumere antidolorifici a base di aspirina o farmaci antiinfiammatori in genere; consentito l'uso di tachipirina. Consultare il chirurgo.