

 Casa di Cura Città di Bra Clinica Privata Accreditata	Direzione Sanitaria Scala di Braden		Mod. 0336	Pag. 1 di 2
			Parola chiave:	braden
			Rev. 03	del 19/06/2017

SCALA DI BRADEN

INDICATORI	VALORI				VALUT. INIZIALE Data:	2° VALUTAZIONE Data:	3° VALUTAZIONE Data:	4° VALUTAZIONE Data:
	4	3	2	1				
PERCEZIONE SENSORIALE Abilità a rispondere in modo corretto alla sensazione di disagio correlata alla pressione.	NON E' LIMITATA	LEGGERMENTE LIMITATA	MOLTO LIMITATA	COMPLETAMENTE LIMITATA				
UMIDITA' Grado di esposizione della pelle all'umidità	RARAMENTE BAGNATO	OCCASIONALMENTE BAGNATO	SPESSO BAGNATO	COSTANTEMENTE BAGNATO				
ATTIVITA' Grado di attività fisica.	CAMMINA FREQUENTEMENTE	CAMMINA OCCASIONALMENTE	IN POLTRONA	COMPLETAMENTE ALLETTATO				
MOBILITA' Capacità di cambiare e di controllare le posizioni del corpo.	LIMITAZIONI ASSENTI	PARZIALMENTE LIMITATA	MOLTO LIMITATA	COMPLETAMENTE IMMOBILE				
NUTRIZIONE Assunzione usuale di cibo.	ECCELLENTE	ADEGUATA	PROBABILMENTE INADEGUATA	MOLTO POVERA				
FRIZIONE E SCIVOLAMENT O		SENZA PROBLEMI APPARENTI	PROBLEMA POTENZIALE	PROBLEMA				
Operatore (Sigla) e punteggio totale								
La decisione circa il piano di prevenzione da adottare deve basarsi oltre che sul punteggio anche su una valutazione complessiva del soggetto. La scala non deve sostituire il giudizio clinico.								
PUNTEGGIO >16 NON A RISCHIO; 16-14 RISCHIO BASSO/MEDIO; 12-9 RISCHIO MEDIO ALTO; <9 RISCHIO ALTISSIMO								

informazioni@ccbra.it	www.ccbra.it
Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Convenzionata. È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.	

 Casa di Cura Città di Bra <i>Clinica Privata Accreditata</i>	Direzione Sanitaria Scala di Braden	Mod. 0336	Pag. 2 di 2
		Parola chiave:	<i>braden</i>
		Rev. 03	del 19/06/2017

SCHEDA LESIONI CUTANEE

CLASSIFICAZIONE DELLA STADIAZIONE SECONDO LINEE GUIDA EPUAP

GRADO 1	Cute intatta con eritema non sbiancante di un'area localizzata generalmente in corrispondenza di una prominenza ossea. Nella cute di pelle scura lo sbiancamento potrebbe non essere osservabile; il suo colore può differire dall'area circostante. L'area può essere dolente, dura, molle, più calda o più fredda in confronto al tessuto adiacente. È possibile che nelle persone di pelle scura la Categoria I sia difficile da individuare. Può segnalare una persona "a rischio"
GRADO 2	Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un'ulcera aperta superficiale con un letto di ferita rosa, senza slough. Può anche presentarsi come vescicola intatta o aperta/rotta ripiena di siero o di siero e sangue. Si presenta come un'ulcera lucida o asciutta, priva di slough o ematoma*. Questa categoria non dovrebbe essere usata per descrivere skin tears (lacerazioni cutanee da strappamento), ustioni da cerotto, dermatiti associate all'incontinenza, macerazione o escoriazione. * L'ematoma indica danno tissutale profondo.
GRADO 3	Perdita di cute a tutto spessore. Il tessuto adiposo sottocutaneo può essere visibile, ma l'osso, il tendine o il muscolo non sono esposti. Può essere presente slough, ma senza nascondere la profondità della perdita tissutale. Può includere tratti sottominati e tunnelizzazione. La profondità di un'ulcera da pressione di Categoria/Stadio III varia a seconda della posizione anatomica. Le narici del naso, l'orecchio, l'occipite e il malleolo non sono dotati di tessuto sottocutaneo (adipe) e le ulcere di Categoria/Stadio III possono essere superficiali. Al contrario, aree con significativa adiposità possono sviluppare ulcere da pressione di Categoria/Stadio III molto profonde. Osso/tendine non sono visibili o direttamente palpabili.
GRADO 4	Perdita di tessuto a tutto spessore con esposizione di osso, tendine o muscolo. Potrebbero essere presenti slough o escara. Spesso include sottominatura e tunnelizzazione. La profondità di un'ulcera da pressione di Categoria/Stadio IV varia a seconda della regione anatomica. Le narici del naso, l'orecchio, l'occipite e i malleoli non hanno tessuto (adiposo) sottocutaneo, e queste ulcere possono essere superficiali. Le ulcere da pressione di Categoria/Stadio IV possono estendersi a muscoli e/o strutture di supporto (es., fascia, tendine o capsula articolare) rendendo probabile l'osteomielite o l'osteite. Ossa \tendine sono esposti, visibili o direttamente palpabili.

TABELLA CARATTERISTICHE

DATA	GRADO SEDE E DIMENSIONE (TIME)	TRATTAMENTO LOCALE	TRATTAMENTO CAUSALE	FIRMA

informazioni@ccbra.it

www.ccbra.it

Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542

Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Convenzionata.

È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.