

	Diagnostica PROFILASSI PER GLI ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO IN CASO DI RISCHIO ALLERGICO	Mod. 0362	Pag. 1 di 1
		Parola chiave:	prof mdc
		Rev. 01	del 01/02/2024

Per i pazienti con comprovato rischio allergico a contrasti iodati o a qualsiasi altra sostanza, è necessaria la seguente profilassi.

PRESCRIZIONE		
<u>DELTACORTENE (Prednisone)</u>	13	ore prima dell'esame
<u>2 compresse da 25mg per bocca:</u>	7	ore prima dell'esame
	1	ora prima dell'esame
<u>ZIRTEC (Cetirizina Dicloridrato)</u>		
<u>10mg per bocca:</u>	4	ore prima dell'esame
Oppure		
<u>TRIMETON (Clorfenamina)</u>	1	ora prima dell'esame
<u>10mg/1ml intramuscolo</u>		

L'indicazione del nome del farmaco è puramente indicativa. Resta a discrezione del Medico curante la possibilità di prescrivere prodotti analoghi di comprovata pari efficacia.

Le posologie indicate si riferiscono ad un adulto di circa 70 kg.

AVVERTENZA:
A discrezione del medico curante, associare alla terapia cortisonica una terapia gastroprotettiva.