

	Angiografia ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE CHE SI SOTTOPONE AD EMBOLIZZAZIONE PROSTATICA	Mod. 0544	Pag. 1 di 1
		Parola chiave:	istrembprost
		Rev. 00	del 05/03/2021

Il giorno prima dell'embolizzazione assumere 1 compressa di Azitromicina da 500 mg dopo pranzo un'altra compressa da 500 mg dovrà essere assunta sempre dopo pranzo il giorno dell'embolizzazione e un'altra nel giorno successivo all'embolizzazione.

Fare un fleet nel primo pomeriggio del giorno precedente l'embolizzazione.

Ingresso in casa di cura il 23 giugno alle 7.30, digiuno (può bere acqua)

Sala angiografica per Embolizzazione arterie prostatiche alle 9.00

Esami propedeutici già eseguiti

Prima della procedura dovrà eseguire le seguenti operazioni:

- firmare un consenso informato
- le sarà fatta la tricotomia inguinale bilaterale
- le sarà applicato un catetere vescicale di FOLEY 16 fr, riempito con 10 ml di soluzione e un'agocannula nell'avambraccio

L'embolizzazione sarà eseguita in una sala angiografica dove sarà disteso su un lettino e, dato che la procedura sarà eseguita in anestesia locale, potrà risultare noioso stare una o due ore disteso su un lettino in posizione supina, pertanto si consiglia di portare eventualmente degli auricolari o delle cuffie per la musica o altro che le piace ascoltare.

Al termine dell'embolizzazione sarà eseguita l'emostasi dell'arteria sede dell'accesso arterioso e quindi successivamente dovrà stare a letto supino fino alle nuove disposizioni dei medici.

Dopo l'embolizzazione delle arterie prostatiche:

- nel giorno successivo all'embolizzazione sarà effettuata la rimozione del catetere urinario,
- dovrà assumere laluril c. una dopo colazione e una dopo cena per 7 giorni
- dovrà prendere una supposta di Topster la sera prima di andare a letto per 7 giorni
- a partire dal secondo giorno dopo l'embolizzazione dovrà assumere 1 compressa di Augmentin 1 gr x 3 per 5 giorni

Nei 7 giorni successivi all'embolizzazione avrà bruciore a urinare e sentirà il bisogno di urinare frequentemente pertanto è consigliabile restare a riposo per una settimana. Inoltre nei primi 2-3 giorni dopo l'embolizzazione avrà sensazione di urgenza e pollachiuria frequenti per cui è consigliabile portare un pannolino assorbente nei 3 giorni successivi alla procedura.

In caso di insorgenza di dolore rettale o febbre nei giorni successivi all'embolizzazione si consiglia di avvertire immediatamente i medici.

informazioni@ccbra.it	www.ccbra.it
Casa di Cura Privata "Città di Bra" Via Montenero 1 - 12042 Bra (Cn) Tel. 0172.472400 Fax 0172.44542 Documento di proprietà della Casa di Cura "Città di Bra" - Clinica Privata Accreditata. È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.	